

Utarbeidet av SE Revidert av AÅ Godkjent av	Standard operasjonsprosedyre Førstehjelp ved dyrebitt	Versjon: 1,1 Utarbeidet: 17.12.2009 Revidert: 04.04.2012
---	---	--

1. Hensikt

Hensikten med prosedyren er at bittskader får nødvendig behandling og oppfølging.

2. Omfang

Prosedyren gjelder alle former for bittskader fra alle dyr.

3. Ansvar

Brukere av AKM skal ha fått trening i håndtering av dyr igjennom den obligatoriske praksisen som er en del av utdanningsopplegget i forsøksdyrlære godkjent av Mattilsynet. Det er den enkelte brukers ansvar å ha gjennomført denne praksisen under veiledning av noen med kompetanse tilsvarende FELASA kategori B eller C og erfaring med de arter det skal jobbes med.

Alle personer som er involvert i dyr på AKM (forskere, forsøksdyrteknikere, veterinær, andre) skal ha stivkrampevaksine som fornyes hvert 5. år.

Nye tilsatte skal ha fått trening i håndtering av dyr under veiledning fra noen blant AKMs personale med kompetanse tilsvarende FELASA kategori B eller C

Den som blir bitt har ansvar for å informere tilgjengelig personale ved AKM om hendelsen.

Den/de av personalet som blir informert om hendelsen har ansvar for å gi nødvendig førstehjelp.

Den som blir bitt har ansvar for å registrere hendelsen som et avvik og rapportere til leder i linjen.

Den/de av personalet som blir informert om hendelsen skal yte bistand til dette.

Leder i linjen håndterer avviksmeldingen. Se SOP: Avvik

4. Definisjon

Bittskade: Skade på hud/underhud/andre strukturer som følge av bitt

5. Utførelse

Bittskader er per definisjon alltid infiserte og skal behandles ut ifra dette. Dersom den skadede ikke kommer til behandling kan det få alvorlige følger som akutt blodforgiftning (sepsis) ved i verste fall døden til følge. Symptomer på reaksjoner ved bittskader:

- Stivhet
- Ømhet
- Varmefølelse
- Feber
- Rød strek langs lymfeåren oppover arm/ben fra bittstedet er tegn på infeksjon i lymfekar (lymfangitt), som kan føre til blodforgiftning (sepsis). Dette må legebehandles straks.

Klem rundt bittstedet, så det får blødd ut. Vask og rens alle skader/bitt med en gang med såpe og vann etterfulgt av desinfeksjonsmiddel (klorheksidin eller pyrisept). Alternativt kan skadestedet bades i lunkent grønnsåpevann.

Alle bittskader som går igjennom huden skal tas alvorlig og bør undersøkes av lege. Besøkende som blir utsatt for bittskader skal alltid sendes til lege. Ansatte som blir bitt skal i utgangspunktet også oppsøke lege ved dyrebitt, eventuelt kan lege kontaktes over telefonen. Dersom skaden skjer i arbeidstid, ta kontakt med HMS-seksjonen hvor vedkommende er ansatt. Dersom kontakt ikke oppnås, ta kontakt med fastlege. Dersom utenfor arbeidstid, ta kontakt med legevakt. Informer om tidspunkt for siste stivkrampevaksine. Lege vil vurdere om oppfriskning av vaksine er nødvendig.

Dyrebitt regnes som avvik, og slike hendelser skal registreres i avvikssystemet, for eventuell senere bruk ved infeksjoner og andre komplikasjoner. Registrer samtidig om bittet er dypt eller overfladisk.

6. Referanser

SOP: Avviksbehandling

7. Vedlegg